

### DATOS GENERALES

<b>IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:</b>	<b>AVGUST – ECUADOR S.A.</b> Km 1.5 Vía Durán – Tambo, Durán, Ecuador. Tel: (593) 4 2800 002 Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Of. 306. Cumbayá, Quito, Ecuador. Tel: (593) 2 6016 686
<b>CLASE:</b>	FUNGICIDA AGRÍCOLA
<b>FORMULACIÓN:</b>	Líquido miscible en aceite (OL)
<b>REGISTRO NACIONAL N°:</b>	25-F16/NA-CL2
<b>PRESENTACIONES AUTORIZADAS:</b>	1L, 4L, 20L, 200 L
<b>INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:</b>	 <b>CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II – MODERADAMENTE PELIGROSO</b> <b>DAÑINO</b> 

### INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>COMPOSICIÓN GARANTIZADA:</b>	Ingrediente activo: Tridemorph.....86o g/L Solvent naphta.....2 g/L Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 Litro
<b>MODO DE ACCIÓN:</b>	Sistémico
<b>MECANISMO DE ACCIÓN:</b>	Actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol, por inhibición de la reducción de esteroides e isomerización en la membrana celular de los hongos, deteniendo su desarrollo
<b>GRUPO QUÍMICO:</b>	Morfolinas
<b>CÓDIFO FRAC:</b>	5, G2

### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Solubilidad	pH	Presión vapor
1.1 mg/l a 20°C (TC)	6.0-9.0 (dispersión acuosa al 1%)	12 mPa a 25°C (TC)
K <sub>ow</sub>	K <sub>oc</sub>	PM
4.2 (pH 7)	2500 - 10000	297.52 kg/mol

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR  
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
Banano ( <i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra ( <i>Mycosphaerella fijiensis</i> )	0.5 l/ha	1	24

\*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

\*\*P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.

\*\*\*N.A: No aplica

### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar con el parecimiento de los primeros síntomas (Grado 1 infección). Aplicar 2 ocasiones cada 14 días en época de baja presión de la enfermedad o cada 8-10 días en alta presión.

### EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para preparar la mezcla emulsión agua-aceite, colocar 6 litros de aceite agrícola/ha mas el emulsificante al 1%, adicionar la mitad de agua, luego agregar la dosis recomendada de **FAITER** y completar el volumen restante con agua. Aplicarlo uniformemente al follaje de las plantas. No debe aplicarse en contra del viento ni cuando la velocidad de este sea mayor a 10 km/hora. Evite derrames y volúmenes exagerados de escorrentía.

### Volúmenes de mezcla recomendados:

90 litros en mezcla total/ha (Aplicación terrestre). En aplicaciones áreas calibrar según vehículo utilizado.

### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

**FAITER** es compatible con la mayoría de los plaguicidas y fertilizantes de uso agrícola. Es incompatible con agentes oxidantes y bases fuertes. Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para el cultivo.

### EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800

VENENO (836366) Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.

AVGUST - ECUADOR S.A. Teléfono 02 6016686-Quito.



Revisión	Fecha	Modificaciones
Primera	13-04-2022	ECU