

### DATOS GENERALES

<b>IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:</b>	<b>AVGUST - ECUADOR S.A.</b> Km 1.5 Vía Durán – Tambo, Durán, Ecuador. Tel: (593) 4 2800 002 Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Of. 306. Cumbayá, Quito, Ecuador. Telf.: (593) 2 6016 686
<b>CLASE:</b>	FUNGICIDA AGRÍCOLA
<b>FORMULACIÓN:</b>	Concentrado Soluble (SL)
<b>REGISTRO NACIONAL N°:</b>	69-F15/NA
<b>PRESENTACIONES AUTORIZADAS:</b>	1 litro, 200 litros
<b>INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:</b>	 <b>CATEGORÍA 4-LIGERAMENTE PELIGROSO</b> <b>ATENCIÓN</b> 

### INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>COMPOSICIÓN GARANTIZADA:</b>	Ingrediente activo: Copper sulphate pentahydrate.....365 g/L Aditivos c.s.p.....1 L
<b>MODO DE ACCIÓN:</b>	<b>VACUN Q</b> es un fungicida foliar con acción preventiva.
<b>MECANISMO DE ACCIÓN:</b>	El ión cobre-II (Cu ++) es absorbido por las esporas durante la germinación y se acumula hasta que se alcanza una concentración suficientemente alta para matar la célula de esporas; la actividad se limita a la prevención de la germinación de las esporas.
<b>GRUPO QUÍMICO:</b>	Compuesto inorgánico
<b>CÓDIGO FRAC:</b>	<b>Mo1</b>

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:	Inflamabilidad	Densidad	PM	pH
	93 °C No inflamable	1.27 g/ml	249.7 g/mol	5.13

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR  
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )	Añublo de la vaina ( <i>Rhizoctonia solani</i> )	1.0 L/ha	7	24

\*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

\*\*P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.

\*\*\*N.A: No aplica

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar dos ocasiones con una frecuencia de 7 días, cuando el cultivo se encuentre en la fase de crecimiento y prefloración o desarrollo vegetativo, aplicar en presencia de la plaga.

#### EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Se utilizo una bomba de mochila a motor de 233 l/ha. Una vez utilizado el equipo de aplicación, lavarlo interna y externamente en el campo y el líquido de enjuague, aspergearlo en el cultivo. Use siempre ropa protectora cuando esté limpiando el equipo de aplicación y evite contaminar las fuentes de agua.

#### Volúmenes de mezcla recomendados:

Arroz: 233 l/ha.

#### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Es compatible con la mayoría de plaguicidas exceptuando los de marcada reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de la mezcla. El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

#### EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX

1800 VENENO (836366) Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.

AVGUST - ECUADOR S.A. Teléfono 02 6016686-Quito



Revisión	Fecha	Modificaciones
Primera	19-04-2022	ECU