

## DATOS GENERALES

<b>IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:</b>	<b>AGARISMAL S.A.</b> Mapasingue Este, Av. 5ta No. 118 y Calle 1era Telf.: 045038410
<b>CLASE:</b>	HERBICIDA AGRÍCOLA
<b>FORMULACIÓN:</b>	Suspensión Concentrada (SC)
<b>REGISTRO NACIONAL N°:</b>	15H-30/NA
<b>PRESENTACIONES AUTORIZADAS:</b>	100 ml, 120 ml, 250 ml, 500 ml, 3.8 litros, 19 litros, 20 litros, 1 litro, 200 litros
<b>INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:</b>	<p><b>CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III- LIGERAMENTE PELIGROSO</b></p> <p><b>CUIDADO</b></p> 

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>COMPOSICIÓN GARANTIZADA:</b>	Ingrediente activo: Ametryn.....500 g/L Excipientes c.s.p.....1 L
<b>MODO DE ACCIÓN:</b>	Sistémico, selectivo
<b>MECANISMO DE ACCIÓN:</b>	Absorbido principalmente por follaje y por raíces con traslocación acropétala vía xilema y acumulación en los meristemos apicales. Inhibidor del transporte de electrones fotosintética en el sitio receptor fotosistema II.
<b>GRUPO QUÍMICO:</b>	Triazinas
<b>CÓDIGO HRAC:</b>	C1

## PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

<b>Solubilidad</b>	<b>Presión de vapor</b>	<b>pH</b>
200 mg/l a 20°C	0.365 mPa a 25°C	7.3
<b>KoW</b>	<b>Densidad</b>	<b>PM</b>
3.77	1120 g/l a 20°C	227.12 g/mol

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR  
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
Banano ( <i>Musa acuminata</i> AAA)	Paja de patillo ( <i>Echinochloa colonum</i> ) Bledo ( <i>Amaranthus hybridus</i> )	3.0 l/ha	N.A.	12
Caña de azúcar ( <i>Saccharum officinarum</i> )	Paja de patillo ( <i>Echinochloa colonum</i> ) Bledo ( <i>Amaranthus hybridus</i> ) Pata de burro ( <i>Eleusine indica</i> L.) Lechosa ( <i>Euphorbia nutans</i> )	4.0 l/ha	N.A.	12

\*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

\*\*P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.

\*\*\*N.A.: No aplica

### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

La aplicación debe dirigirse al área foliar se las malezas y al suelo. En banano se recomienda, una aplicación post emergencia temprana de las malezas. En caña de azúcar se recomienda una aplicación en pre o post emergencia temprana de las malezas.

### EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llenar el tanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua y agregar la dosis necesaria de CAÑAVERAL. Mantener agitación constante. Rellenar con agua hasta completar el volumen de aplicación. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

### Volúmenes de mezcla recomendados:

Banano: 300 L/ha

Caña de azúcar: 400 L/ha

## COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Evitar el contacto con oxidantes fuertes: ácidos y bases. El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

## EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas. AGARISMAL S.A. Teléfono 045038410 Mapasingue.



Revisión	Fecha	Modificaciones
Primera	10-08-2023	ECU