

# PLAN DE MANEJO EN EL CULTIVO DE MAÍZ



Fenología		Pre-siembra	Siembra / Emergencia	Etapa Vegetativa			Emisión Flor Masculina	Formación de Mazorca/ Ciosecha
MALEZAS	PRE EMERGENTE (Hoja Angosta y Hoja Ancha)		NOMAD (Tebuconazole + Propiconazole)					
			KAIKET (Atrazina)					
			TERIGRAN (Terbutrina)					
	POST EMERGENTE (Hoja Ancha)	**2,4 D Amina						
	AMPLIO ESPECTRO (Preemergente al cultivo Post dirigido a la maleza)	**Glyphosate salt			AVGOLD (Nicosulfuron+ Thifensulfuron methyl)			
	**Glufosinato de amonio							
	**Paraquat							
DESINFECCIÓN DE SEMILLA	GALLINA CIEGA (Phyllophaga sp) DIABROTICA (Diabrotica virgifera zeae) GUSANO ALAMBRE (Agriotes sp)	TABU (Imidacloprid)						
		THIODI (Thiodicarb)						
PLAGAS	GALLINA CIEGA (Phyllophaga sp) DIABROTICA (Diabrotica virgifera zeae) GUSANO ALAMBRE (Agriotes sp)	BOLIDO (Chlorpyrifos)						
		**Cypermethrina+ Chlorpyrifos						
	GUSANO TROZADOR (Agrotis sp)		**Acefato					
	SALTA HOJA/LORITO VERDE (Dalbulus maidis)		BANZAI (Lambda-cyhalothrin+ Thiamethoxam)	DUOTRON (Acetamiprid + Emamectin benzoate)				
	GUSANO COGOLLERO (Spodoptera frugiperda)			DYNAMIET (Carbosulfan)	BARAI (Emamectin benzoate + Lufenuron)	RONFOS (Lufenuron + Profenofos)		
	BARRENADORES (Diatraea sp)				THANAVIN (Methomyl)	AVLURON (Lufenuron)	BENZEN (Emamectin benzoate)	
					BANZAI (lambda- cyhalothrin+ thiamethoxam)	TAISON (Acefato)		
					COURAGE (Profenofos)			
ENFERMADES	MANCHA DE ASFALTO (Phyllachora maydis) (Monographella maydis) QUEMAZON FOLIAR (Helminthosporium sp)				**Sulfato de cobre pentahidratado	NOMAD (Propiconazole + Tebuconazole)	FLUTRIOXIM (Azoxytrobin + Flutriafol)	
					**Chlorothalonil 720 g/l; SC	DIFAZ (Azoxytrobin 00g/kg + Difenoconazole 125 g/kg; GDA)	NOMAD (Propiconazole+ Tebuconazole)	
						PRELUDE (Myclobutanil)		

\*En proceso de ampliación.

\*\*Ingrediente activo registrado para control de Plagas pertenecientes a la misma familia, en otros cultivos.